

Einnahmehinweise und Vorgehen bei Schluckbeschwerden

NRTIs

Handelsname	Substanz	Dosis	Einnahme und Essen	Bei Schluckbeschwerden
Combivir®	Azidothymidin / Lamivudin	2x1 Tbl 300/150mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Kivexa®	<u>Abacavir / Lamivudin</u>	1x1 Tbl 600/300mg	unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Truvada®	<u>Emtricitabin/ Tenofovir Diproxil</u>	1x1 Tbl 300/200mg	mit Mahlzeit	in 100 mL Wasser, Orangen- Traubensaft lösbar
Descovy®	Emtricitabin/ Tenofovir Alafenamid	1x1 Tbl 200/10mg (RTV o. Cobi). 1x1 Tbl 200/25mg (DTG, RAL EFV, NVP, RPV, MVC)	unabhängig	Umsteigen auf Truvada®
Retrovir®	Zidovudin	2x1 Kps 250mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Epivir®	Lamivudin	1x1 Tbl 300mg o. 2x1 Tbl 150mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Ziagen®	Abacavir	1x 2 Tbl 300mg o. 2 x 1Tbl 300mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Viread®	Tenofovir Diproxil	1x1 Tbl 300mg	mit Mahlzeit	in 100 mL Wasser, Orangen- Traubensaft lösbar
Emtriva®	Emtricitabin	1x1 Kps 30mg	unabhängig	Nicht teilbar, Granulat mit Apfelmus mengbar
Trizivir®	Azidothymidin / Lamivudin/ Abacavir	2x1 Tbl 300/150/300mg	unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

NNRTI - Nicht-nukleosidische Reversetranskriptasehemmer

Handelsname	Substanz	Dosis	Einnahme und Essen	Bei Schluckbeschwerden
Sustiva®	Efavirenz	1x1 Tbl 600mg	nüchternen Magen vor dem Schlafen gehen	Kapsel Formulierung nutzen
Sustiva®	Efavirenz	50 mg 100 mg 200 mg	nüchtern	Kapsel öffnen, Kapselinhalt mit kleiner Nahrungsmenge, nicht später als 30 Min. nach Vermengung, verabreichen. Innerhalb von 2 h nach Einnahme keine weitere Nahrung
Efavirenz Hexal®	Efavirenz	1x1 Tbl 600mg	nüchtern	Tablette kann in gleiche Hälften geteilt werden.
Viramune® Tabl	Nevirapin	1x1 Tbl 200 mg (Tag 1-14) bzw. 400mg (ab Tag 15)	unabhängig	flüssige Formulierung (50 mg/5 ml) erhältlich
Viramune® ret®	Nevirapin	50 mg, 100 mg 400 mg	unabhängig	flüssige Formulierung erhältlich, Retardtbl nicht zerkleinern!
Nevirapin Hexal®	Nevirapin	200 mg	unabhängig	
Intelence®	Etravirin	2x1 Tbl 200mg	nach Mahlzeit	Tablette ist wasserlöslich.
Edurant®	Rilpivirin	1x1 Tbl 25mg	mit Mahlzeit	nicht kauen oder brechen.
Atripla®	Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabin		Vor dem Schlafen, nicht zum Essen, 1 Std davor oder danach	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Eviplera®	Tenofovir / Emtricitabin / Rilpivirin	1x1 Tbl 300/200/25mg	mit Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Odefsey®	Emtricitabin/ Tenofovir Alafenamid/ Rilpivirin		mit Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

PI- Protease Inhibitor

Handelsname	Substanz	Dosis	Essen	Bei Schluckbeschwerden
Kaletra®	Lopinavir/ Ritonvir	1x4 Tbl 200/50mg oder 2x2 Tbl 200/50mg	unabhängig	flüssige Formulierung erhältlich nicht zerkauen, zerbrechen zerdrücken!
Norvir®	Ritonvir	1x1 Tbl 100mg	mit der Mahlzeit	flüssige Formulierung erhältlich nicht zerkauen, zerbrechen zerdrücken!
Prezista®	Darunavir	DRV: 1x1 Tbl 800mg, RTV: 1x1 Tbl 100mg	mit der Mahlzeit bzw. innerhalb von 30 Minuten nach Beendigung einer Mahlzeit	flüssige Formulierung erhältlich Theoretisch: Zerteilen, möglich. 2 Fallberichte: Prezista® stets frisch gemörsert und mit Nahrung (ggf. Trink- nahrung) geben
Reyataz®	Atazanavir	ATV: 1x1 Kps 300mg, RTV: 1x1 Tbl 100mg	1x täglich mit Mahlzeit	Kapselinhalt kann mit Apfelmus vermischen
Telzir®	Fosamprenavir	FPV: 2x1 Tbl 700mg, RTV: 2x1 Tbl 100mg	mit oder ohne einer Mahlzeit	flüssige Formulierung erhältlich
Rezolsta®	Darunavir, Cobicistat		<30 min nach der Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

Integrasehemmer

Handelsname	Substanz	Dosis	Ennahme und Essen	Bei Schluckbeschwerden
Isentress®	<u>Raltegravir</u>	ATV/r oder LPV/r: 1x1 Tbl 85mg	unabhängig	2x1 Tbl 400mg
Tivicay®	<u>Dolutegravir</u>	2x1 Tbl 50mg	unabhängig	
Triumeq®	<u>Dolutegravir/</u> <u>Abacavir /</u> <u>Lamivudin</u>	1 x 1 Tabl 50/600/300 mg	unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

Stribild®	<u>Elvitegravir / Cobicistat / Tenofovir / Emtricitabin</u>	1x1 Tbl 300/200/150/ 150 mg	mit der Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Genvoya®	Emtricitabin/ Tenofovir Alafenamid/ Elvitegravir/ Cobicistat	1 x 1 Tbl 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg	mit der Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen; TAF gegen TDF ersetzen
Triumeq®	<u>Abacavir / Lamivudin / Dolutegravir</u>		unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

Quelle: <https://www.hivandmore.de/medikamente/>
Fachinformation der einzelnen Medikamente