

# Übersicht über die Medikamente

## NRTI - Nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Emtriva®	<a href="#">Emtricitabin</a>	FTC	Gilead
Epivir®	<a href="#">Lamivudin</a>	3TC	ViiV
Retrovir®	<a href="#">Azidothymidin/Zidovudin</a>	AZT/ZDV	ViiV
Videx®	<a href="#">Didanosin</a>	ddI	BMS
Viread®	<a href="#">Tenofovir Diproxil</a>	TDF	Gilead
Zerit®	<a href="#">Stavudin</a>	D4T	BMS
Ziagen®	<a href="#">Abacavir</a>	ABC	ViiV

## NNRTI - Nicht-nukleosidische Reversetranskriptasehemmer

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Edurant®	<a href="#">Ralpivirin</a>	RLP	Janssen-Cilag
Intelence®	<a href="#">Etravirin</a>	ETV	Janssen-Cilag
Sustiva®	<a href="#">Efavirenz</a>	EFV	BMS
Viramune®	<a href="#">Nevirapin</a>	NVP	Boehringer Ingelheim

## Proteasehemmer

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Aptivus®	<a href="#">Tipranavir</a>	TPV	Boehringer Ingelheim
Crixivan®	<a href="#">Indinavir</a>	IDV	MSD
Invirase®	<a href="#">Saquinavir</a>	SQV	Hoffmann-La Roche
Kaletra®	<a href="#">Lopinavir</a>	LPV/r	Abbvie
Prezista®	<a href="#">Darunavir</a>	DRV	Janssen-Cilag
Reyataz®	<a href="#">Atazanavir</a>	ATV	Bristol-Myers Squibb
Telzir®	<a href="#">Fos-Amprenavir</a>	fAPV	ViiV
Viracept®	<a href="#">Nelfinavir</a>	NLV	Hoffmann-La Roche

## Booster Substanzen

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Norvir®	<a href="#">Ritonavir</a>	RTV	Abbvie
Tybost®	<a href="#">Cobicistat</a>		Gilead Sciences

## Entry Inhibitoren

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Celsentri®	<a href="#">Maraviroc</a>	MRC	ViiV
Fuzeon®	<a href="#">Enfuvirtid</a>	ENF, T-20	Hoffmann La-Roche

## Integrasehemmer

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Isentress®	<a href="#">Raltegravir</a>	RAL	MSD
Tivicay®	<a href="#">Dolutegravir</a>	DLG	ViiV Healthcare

## Kombinationen

Handelsname	Substanz	Abkürzung	Hersteller
Combivir®	Azidothymidin / Lamivudin	AZT/ABC	ViiV
Descovy®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid	F/TAF	Gilead
Kivexa®	<a href="#">Abacavir / Lamivudin</a>	ABC/3TC	ViiV
Trizivir®	<a href="#">Azidothymidin / Abacavir / Lamivudin</a>	AZT/ABC/3TC	ViiV
Truvada®	<a href="#">Emtricitabin/Tenofovir Diproxil</a>	TDF/FTC	Gilead
Atripla®	Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabin	EFV/TDF/FTC	BMS/ Gilead
Eviplera®	Tenofovir / Emtricitabine / Rilpivirin	TDF/FTC/RLP	Janssen- Cilag/ Gilead
Odefsey®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid/ Rilpivirin	FTC/TAF/RPV	Gilead
Genvoya®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid/Elvitegravir/Cobicistat	F/TAF/EVG/c	Gilead
Stribild®	<a href="#">Elvitegravir / Cobicistat / Tenofovir / Emtricitabin</a>	TDF/FTC/EVG /c	Gilead
Triumeq®	<a href="#">Abacavir / Lamivudin / Dolutegravir</a>	ABC/3TC/DTG	ViiV

Quelle: <https://www.hivandmore.de/medikamente/>

## Einnahmehinweise und Vorgehen bei Schluckbeschwerden

### NRTIs

Handelsname	Substanz	Dosis	Einnahme und Essen	Bei Schluckbeschwerden
Ziagen®	Abacavir	1x 2 Tbl 300mg o. 2 x 1Tbl 300mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Retrovir®	Zidovudin	2x1 Kps 250mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Emtriva®	Emtricitabin	1x1 Kps 30mg	unabhängig	Nicht teilbar, Granulat mit Apfelmus mengbar
Epivir®	Lamivudin	1x1 Tbl 300mg o. 2x1 Tbl 150mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Viread®	Tenofovir Diproxil	1x1 Tbl 300mg	mit Mahlzeit	in 100 mL Wasser, Orangen- Traubensaft lösbar
Kivexa®	<u>Abacavir / Lamivudin</u>	1x1 Tbl 600/300mg	unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Truvada®	<u>Emtricitabin/ Tenofovir Diproxil</u>	1x1 Tbl 300/200mg	mit Mahlzeit	in 100 mL Wasser, Orangen- Traubensaft lösbar
Combivir®	Azidothymidin / Lamivudin	2x1 Tbl 300/150mg	unabhängig	Flüssige Formulierung erhältlich
Trizivir®	Azidothymidin / Lamivudin/ Abacavir	2x1 Tbl 300/150/300mg	unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Descovy®	Emtricitabin/ Tenofovir Alafenamid	1x1 Tbl 200/10mg (RTV o. Cobi). 1x1 Tbl 200/25mg (DTG, RAL EFV, NVP, RPV, MVC)	unabhängig	Umsteigen auf Truvada®

## NNRTI - Nicht-nukleosidische Reversetranskriptasehemmer

Handelsname	Substanz	Dosis	Einnahme und Essen	Bei Schluckbeschwerden
Sustiva®	Efavirenz	1x1 Tbl 600mg	nüchternen Magen vor dem Schlafen gehen	Kapsel Formulierung nutzen
Sustiva®	Efavirenz	50 mg 100 mg 200 mg	nüchtern	Kapsel öffnen, Kapselinhalt mit kleiner Nahrungsmenge, nicht später als 30 Min. nach Vermengung, verabreichen. Innerhalb von 2 h nach Einnahme keine weitere Nahrung
Efavirenz Hexal®	Efavirenz	1x1 Tbl 600mg	nüchtern	Tablette kann in gleiche Hälften geteilt werden.
Viramune® Tabl	Nevirapin	1x1 Tbl 200 mg (Tag 1-14) bzw. 400mg (ab Tag 15)	unabhängig	flüssige Formulierung (50 mg/5 ml ) erhältlich
Viramune® ret®	Nevirapin	50 mg, 100 mg 400 mg	unabhängig	flüssige Formulierung erhältlich, Retardtbl nicht zerkleinern!
Nevirapin Hexal®	Nevirapin	200 mg	unabhängig	
Intelence®	Etravirin	2x1 Tbl 200mg	nach Mahlzeit	Tablette ist wasserlöslich.
Edurant®	Rilpivirin	1x1 Tbl 25mg	mit Mahlzeit	nicht kauen oder brechen.
Atripla®	Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabin		Vor dem Schlafen, nicht zum Essen, 1 Std davor oder danach	Umsteigen auf die Einzelsubstanzen
Eviplera®	Tenofovir / Emtricitabin / Rilpivirin	1x1 Tbl 300/200/25mg	mit Mahlzeit	Umsteigen auf die Einzelsubstanzen
Odefsey®	Emtricitabin/ Tenofovir Alafenamid/ Rilpivirin		mit Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

## PI- Protease Inhibitor

Handelsname	Substanz	Dosis	Essen	Bei Schluckbeschwerden
Kaletra®	Lopinavir/ Ritonvir	1x4 Tbl 200/50mg oder 2x2 Tbl 200/50mg	unabhängig	flüssige Formulierung erhältlich nicht zerkauen, zerbrechen zerdrücken!
Norvir®	Ritonvir	1x1 Tbl 100mg	mit der Mahlzeit	flüssige Formulierung erhältlich nicht zerkauen, zerbrechen zerdrücken!
Prezista®	Darunavir	DRV: 1x1 Tbl 800mg, RTV: 1x1 Tbl 100mg	mit der Mahlzeit bzw. innerhalb von 30 Minuten nach Beendigung einer Mahlzeit	flüssige Formulierung erhältlich Theoretisch: Zerteilen, möglich. 2 Fallberichte: Prezista® stets frisch gemörsert und mit Nahrung (ggf. Trink- nahrung) geben
Reyataz®	Atazanavir	ATV: 1x1 Kps 300mg, RTV: 1x1 Tbl 100mg	1x täglich mit Mahlzeit	Kapselinhalt kann mit Apfelmus vermischen
Telzir®	Fos- amprenavir	FPV: 2x1 Tbl 700mg, RTV: 2x1 Tbl 100mg	mit oder ohne einer Mahlzeit	flüssige Formulierung erhältlich
Rezolsta®	Darunavir, Cobicistat		<30 min nach der Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

## Integrasehemmer

Handelsname	Substanz	Dosis	Ennahme und Essen	Bei Schluck- beschwerden
Isentress®	<u>Raltegravir</u>	ATV/r oder LPV/r: 1x1 Tbl 85mg	unabhängig	2x1 Tbl 400mg
Tivicay®	<u>Dolutegravir</u>	2x1 Tbl 50mg	unabhängig	
Triumeq®	<u>Dolutegravir/</u> <u>Abacavir /</u> <u>Lamivudin</u>	1 x 1 Tabl 50/600/300 mg	unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

Stribild®	<u>Elvitegravir / Cobicistat / Tenofovir / Emtricitabin</u>	1x1 Tbl 300/200/150/ 150 mg	mit der Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen
Genvoya®	Emtricitabin/ Tenofovir Alafenamid/ Elvitegravir/ Cobicistat		mit der Mahlzeit	Umsteigen auf Einzelsubstanzen; TAF gegen TDF ersetzen
Triumeq®	<u>Abacavir / Lamivudin / Dolutegravir</u>		unabhängig	Umsteigen auf Einzelsubstanzen

Quelle: <https://www.hivandmore.de/medikamente/>  
Fachinformation der einzelnen Medikamente

## Was tue ich, wenn ich meine Tabletten vergessen habe.....

### Kombinationen

Kivexa®	<u>Abacavir / Lamivudin</u>	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Truvada®	<u>Emtricitabin/Tenofovir Diproxil</u>	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Combivir®	Azidothymidin / Lamivudin	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Descovy®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid	Einnahme bis 18 Stunden danach.
Stribild®	<u>Elvitegravir / Cobicistat / Tenofovir / Emtricitabin</u>	Einnahme bis 18 Stunden danach.
Genvoya®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid/Elvitegravir/Cobicistat	Einnahme bis 18 Stunden danach.
Triumeq®	<u>Abacavir / Lamivudin / Dolutegravir</u>	Wenn die nächste Dosis innerhalb der nächsten 4 Stunden fällig ist, vergessene Dosis auslassen und nächste Dosis zur

		üblichen Zeit einnehmen.
Atripla®	Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Eviplera®	Tenofovir / Emtricitabine / Rilpivirin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Odefsey®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid/ Rilpivirin	Einnahme bis 18 Stunden danach.

### NRTI - Nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

Handelsname	Substanz	
Ziagen®	Abacavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Retrovir®	Zidovudin	Einnahme ausfallen lassen, wenn die nächste Dosis innerhalb von 2 Stunden eingenommen werden muss.
Emtriva®	Emtricitabin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Epivir®	Lamivudin	Sobald daran gedacht wird, einnehmen und weiter wie bisher fortsetzen. Eine Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Descovy®	TAF	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Viread®	Tenofovir Diproxil	Einnahme ausfallen lassen, wenn die nächste Dosis innerhalb von 2 Stunden eingenommen werden muss.

### NNRTI - Nicht-nukleosidische Reversetranskriptasehemmer

Handelsname	Substanz	
Sustiva	Efavirenz	Nehmen Sie die nächste Dosis so bald wie möglich ein. Nehmen Sie jedoch keine doppelte Dosis
Viramune Tabl.	Nevirapin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Viramune ret.	Nevirapin	
Intelence®	Etravirin	Einnahme bis zu 6 Stunden nach üblichen Einnahmezeitpunkt nach einer Mahlzeit nachholen und dann die nächste Dosis wieder zur gewohnten Zeit .
Edurant	Rilpivirin	Einnahme bis 12 Stunden danach mit einer Mahlzeit, danach erst wieder zu üblichem Einnahmezeitpunkt.

### Proteasehemmer

Handelsname	Substanz	
	Atazanavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Wenn es fast schon Zeit bis zur nächsten Dosis, dann auslassen. Verdoppelung der Dosis

		vermeiden.
	Darunavir	Einnahme von Darunavir/Ritonavir bzw. Darunavir/Cobicistat bis 12 Stunden danach mit dem Essen. Danach nicht mehr einnehmen. Dann weiter wie bisher.
	Lopinavir	Einnahme bis 12 Stunden danach.
	<a href="#">Fos-Amprenavir</a>	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
	Saquinavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird mit dem Essen, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.

### Booster Substanzen

Handelsname	Substanz	
Norvir®	<a href="#">Ritonavir</a>	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Tybost®	<a href="#">Cobicistat</a>	Einnahme bis 12 Stunden danach mit dem Essen.

### Entry Inhibitoren

Handelsname	Substanz	
Celsentri®	<a href="#">Maraviroc</a>	Bei weniger als 6 Stunden, sollte die vergessene Dosis ausgelassen werden.
Fuzeon®	<a href="#">Enfuvirtid</a>	Bei weniger als 6 Stunden, sollte die vergessene Dosis ausgelassen werden.

### Integrasehemmer

Handelsname	Substanz	
Isentress®	<a href="#">Raltegravir</a>	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Tivicay®	<a href="#">Dolutegravir</a>	Einnahme bis 20 Stunden danach.
Vitekta®	<a href="#">Elvitegravir</a>	Einnahme bis 18 Stunden danach mit dem Essen.