

Was tue ich, wenn ich meine Tabletten vergessen habe.....

Kombinationen

Handelsname	Substanz	Hinweise beim Vergessen einer Tablette
Kivexa®	Abacavir / Lamivudin	Einnahme sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Truvada®	Emtricitabin/Tenofovir Diproxil	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Combivir®	Azidothymidin / Lamivudin	Einnahme sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Descovy®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid	Einnahme bis 18 Stunden danach.
Stribild®	Elvitegravir / Cobicistat / Tenofovir / Emtricitabin	Einnahme bis 18 Stunden danach.
Genvoya®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid/Elvitegravir/Cobicistat	Einnahme bis 18 Stunden danach.
Triumeq®	Abacavir / Lamivudin / Dolutegravir	Wenn die nächste Dosis innerhalb der nächsten 4 Stunden fällig ist, vergessene Dosis auslassen und nächste Dosis zur üblichen Zeit einnehmen.
Atripla®	Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Eviplera®	Tenofovir / Emtricitabine / Rilpivirin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Odefsey®	Emtricitabin/Tenofovir Alafenamid/Rilpivirin	Einnahme bis 18 Stunden danach.

NRTI - Nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

Handelsname	Substanz	Hinweise beim Vergessen einer Tablette
Ziagen®	Abacavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Retrovir®	Zidovudin	Einnahme ausfallen lassen, wenn die nächste Dosis innerhalb von 2 Stunden eingenommen werden muss.
Emtriva®	Emtricitabin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Epivir®	Lamivudin	Sobald daran gedacht wird, einnehmen und weiter wie bisher fortsetzen. Eine Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Viread®	Tenofovir Diproxil	Einnahme ausfallen lassen, wenn die nächste Dosis innerhalb von 2 Stunden eingenommen werden muss.

NNRTI - Nicht-nukleosidische Reversetranskriptasehemmer

Handelsname	Substanz	
Sustiva®	Efavirenz	Nehmen Sie die nächste Dosis so bald wie möglich ein. Nehmen Sie jedoch keine doppelte Dosis
Viramune® Tabl.	Nevirapin	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Viramune ret.®	Nevirapin	
Intelence®	Etravirin	Einnahme bis zu 6 Stunden nach üblichem Einnahmezeitpunkt nach einer Mahlzeit nachholen und dann die nächste Dosis wieder zur gewohnten Zeit .
Edurant®	Rilpivirin	Einnahme bis 12 Stunden danach mit einer Mahlzeit, danach erst wieder zu üblichem Einnahmezeitpunkt.

Proteasehemmer

Handelsname	Substanz	
Reyataz®	Atazanavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Wenn es fast schon Zeit bis zur nächsten Dosis, dann auslassen. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Prezista®	Darunavir	Einnahme von Darunavir/Ritonavir bzw. Darunavir/Cobicistat bis 12 Stunden danach mit dem Essen. Danach nicht mehr einnehmen. Dann weiter wie bisher.
Kaletra®	Lopinavir/ Ritonavir	Einnahme bis 12 Stunden danach.
Telzir®	<u>Fosamprenavir</u>	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Invirase®	Saquinavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird mit dem Essen, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.

Booster Substanzen

Handelsname	Substanz	
Norvir®	Ritonavir	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Tybost®	<u>Cobicistat</u>	Einnahme bis 12 Stunden danach mit dem Essen.

Entry Inhibitoren

Handelsname	Substanz	
Celsentri®	<u>Maraviroc</u>	Bei weniger als 6 Stunden, sollte die vergessene Dosis ausgelassen werden.
Fuzeon®	<u>Enfuvirtid</u>	Bei weniger als 6 Stunden, sollte die vergessene Dosis ausgelassen werden.

Integrasehemmer

Handelsname	Substanz	
Isentress®	<u>Raltegravir</u>	Einnahme: sobald daran gedacht wird, dann weiter wie bisher. Verdoppelung der Dosis vermeiden.
Tivicay®	<u>Dolutegravir</u>	Einnahme bis 20 Stunden danach.